

يتعرض المجتمع المصري في الآونة الأخيرة إلى ظاهرة تمثل خطراً شديداً على الصحة العامة إلا و هي هوس تعاطي دواء الترامادول. هذا الدواء يعتبر من الأدوية أفيونية المفعول التي من المفترض استخدامها للألم المتوسط أو الشديد لفترة معينة من الوقت مناسبة لعلاج تلك الألام. تهدف هذه الدراسة إلى التركيز على الاستخدام طويل الأمد للتрамادول و التأثير على الوظائف المخية و التناسلية لذكور الجرذان. تم اعطاء جرعتين من الترامادول إلا هو هما 10 و 30 مجم/كجم يومياً لفترتين زمنيتين إلا و هما 9 و 17 أسبوعاً. تم تقييم مؤشرات سلوكية، جودة سائل المنى، مستوى الناقلات العصبية في المخ، مؤشرات الاكسدة و التسمم في الخصية، محتوى مصل الدم من هرمون التيستوستيرون و مؤشرات الالتهاب. تشير النتائج إلى تدهور في جودة سائل المنى و المؤشرات السلوكية، ارتفاع مستوى مصل الدم من مؤشرات الالتهاب و انخفاضه من هرمون التيستوستيرون، اضطرابات في الناقلات العصبية و عدم التغيير في مؤشرات الاكسدة. يستخلص من ذلك أن الترامادول له آثار سلبية على وظائف المخ و الخصية في الاستعمال طويل المدى و بالتالي يجب الابلاغ عن هوس تعاطي الترامادول.