

## الدارس

دينا صلاح عبد القادر

## عنوان الرسالة

مقارنة بين حقن عقار الترامادول والفتانيل في عمليات استئصال اللوز والحمية للاطفال في جراحات اليوم الواحد

## اسماء المشرفين

أ.د/ عبد الحميد ابراهيم محمد

أ.د/ عبد الملى رجب عبد الكريم

أ.د/ ماجد محمد مختار

## ملخص الرسالة

فى وضع ما بعد الجراحة ، من الصعب جدا تقييم السبب الدقيق للارق او بكاء الطفل، هل هو من الجوع والخوف او الالم بعد العملية الجراحية . هناك العديد من الاسباب التى قد تؤدى الى فشل السيطرة على الالم بعد العملية الجراحية مثل الاعتقاد الخاطى بأن الاطفال لا يشعرون بالالم كما يشعر البالغون ن او ان الاعراض الجانبية للادوية المسكنة للالم تكون اكثر تأثيرا على الاطفال ، او تقييم الالم بطريقة غير صحيحة او النقص فى التمريض او حتى زيادة الاعمال على الفريق الطبى مما تجعله ينشغل عن معالجة الالم الذى يشعر به الطفل.

توجد طرق مختلفة للسيطرة على الالم فى الاطفال وتشمل الطرق غير الدوائية مثل العلاج الطبيعى والادوية اما غير الافيونية مثل المورفين ، الفتانيل . ومن خلال فهم اساليب التقييم والخيارات العلاجية المتاحة للسيطرة على الالم وطبيعة العملية الجراحية يكون للصيدلى دور هام فى السيطرة على الالم بعد العملية الجراحية عند الاطفال.

## الدارس

محمود ابراهيم مصطفى

## عنوان الرسالة

نمذجة الحركية الدوائية لعقار السيكلوسبورين اعتمادا على بيانات المراقبة العلاجية فى المرضى المصريين

## اسماء المشرفين

أ.د/ عبد الحميد ابراهيم محمد

أ.د/ احمد على جمعة

## ملخص الرسالة

يعتبر زرع الخلايا الجذعية الدموية ( HSCT ) من خلال متبرع من الطرق الهامة التى لها تطبيق واسع فى علاج عدد كبير من الحالات سواء المصابة بأورام سرطانية او حالات غير سرطانية ولكن من اهم معوقات التطبيق لهذه الطريقة فى العلاج هو التفاعل المناعى بين الخلايا الناتجة من النخاع المزروع وخلايا الجسم الذى يعرف بداء الطعم حيال الثوى (GVHD) ولأجل تجنبه يتم استخدام مثبطات المناعة منفردة او مجتمعة فى مرضى زرع الخلايا الجذعية الدموية واهمها السيكلوسبورين ( CSA ) لمنع هذه التفاعلات المناعية ومضاعفاتها. هذا البحث هدف الى دراسة العوامل المؤثرة فى حركية السيكلوسبورين وذلك فى مرضى زرع الخلايا الجذعية الدموية المصريين وتحديد العلاقة المحتملة بين المتغيرات الخاصة بكل مريض وتقديرات الحركية الدوائية لهذه المجموعة من المرضى وكذلك استنتاج نماذج للحركية الدوائية للعشيرة للسيكلوسبورين.

توصى الدراسة بالمراقبة المستمرة لمستوى دواء السيكلوسبورين بالدم لكل مريض من مرضى زرع الاعضاء . وخاصة مرضى زرع الخلايا الجذعية الدموية وذلك لتجنب سمية الدواء وحدوث داء الطعم حيال الثوى . وكذلك باستبدال الطريق التقليدية بالطريقة التى تم عرضها .

## الدارس

محمد احمد مبارز

## عنوان الرسالة

جمع الانترفيرون طويل المفعول والريبافيرين مع السوفوسبوفير في مقابل الانترفيرون طويل المفعول والريبافيرين لعلاج مرضى الالتهاب الكبدى الوبائى سى فى المصريين

## اسماء المشرفين

أ.د/ عبد الحميد ابراهيم محمد

أ.د/ رمضان احمد رمضان

## ملخص الرسالة

- تحديد فاعلية الانترفيرون مع السوفوسبوفير والريبافيرين فى مقابل فاعلية عقار الريبافيرين والريبافيرين فقط فى علاج مرضى الالتهاب الكبدى الوبائى سى فى مصر .
- تحديد عوامل الامان المتعلقة باستخدام الانترفيرون مع السوفوسبوفير والريبافيرين فى علاج مرضى الالتهاب الكبدى الوبائى سى فى مصر .
- دراسة تأثير بعض المتغيرات على قابلية الاستجابة لمرضى الالتهاب الكبدى الوبائى سى فى مصر الذين يعالجون الانترفيرون مع السوفوسبوفير والريبافيرين.

الاستنتاجات: فاعلية وامن العقارين بالجروب الاول تحت الدراسة اقل من فاعلية العقاقير الثلاثة بالجروب الثانى